

**BORSA DI STUDIO
MARCO GALLETO**

IPASVI LA SPEZIA

**“ CREAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI ASSISTENZA
INFERMIERISTICA ”**

**INFERMIERA PROFESSIONALE
RIZZO GIOVANNA**

**IGIENE ED APPARECCHIATURA DELLA URETERO-CUTANEO
STOMIA**

IGIENE E APPARECHIATURA DELLA URETERO-CUTANEO-STOMIA

PROTOCOLLO DI LAVORO

DESTINATARI:

PERSONALE SANITARIO ADDETTO ALLA CURA DELLA PERSONA PORTATRICE DI URETEROCUTANEOSTOMIA MONO E/O BILATERALE.

OBIETTIVI:

MANTENERE LA CUTE INTEGRA
GARANTIRE L'ADESIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E QUINDI LA CONTINENZA
PREVENIRE L'INFILTRAZIONE DI SECRETI E URINA AL DI SOTTO DELLA PLACCA
EDUCARE LA PERSONA ALLA GESTIONE E IGIENE PERSONALE DELLA STOMIA

RISORSE :

STOMATERAPISTA
INFERMIERE PROFESSIONALE
ASSISTENTE SOCIO SANITARIO ADDETTO ALLA CURA E IGIENE DELLA PERSONA

MATERIALE:

SACCHETTO DEI RIFIUTI
SISTEMA DI RACCOLTA MONOPEZZO O DUE PEZZI
ACQUA TIEPIDA POTABILE
SAPONE NEUTRO O SOLUZIONE DETEREGENTE
PANNO CARTA O GARZA NON STERILE
FORBICI
PASTA BARRIERA O POLVERE PROTETTIVA
GUANTI MONOUSO
MERCORO CROMO O SOLUZIONE DI EOSINA
BACINELLA PULITA
RASOIO MONOUSO
FIALE DI FISIOLÓGICA STERILE DA 10 CC.
SIRINGHE MONOUSO DA 10 CC.

PROCEDURA

- INDOSSARE I GUANTI
- SVOTARE LA SACCA DI RACCOLTA CONTROLLANDO IL COLORE DELLE URINE
- FAR ASSUMERE ALLA PERSONA LA POSIZIONE SUPINA
- RIMUOVERE IL PRESIDIO IN SITU STACCANDO LA PLACCA DALL'ALTO VERSO IL BASSO TENENDO CON LE DITA LA CUTE E UMIDIFICANDO, NON FAR FUORIUSCIRE I TUTORI URETERALI SE PRESENTI
- APPOGGIARE SULLA STOMIA UN TAMPONE DI GARZA O DI PANNOCARTA
- DETERGERE LA CUTE PERISTOMALE CON MOVIMENTI CIRCOLARI PARTENDO DALLA GIUNZIONE MUCO-CUTANEA VERSO L'ESTERNO
- ASCIUGARE LA CUTE CON PANNOCARTA O GARZA
- SE PRESENTI PELI CUTANEI NELLA ZONA PERISTOMALE RADERE
- TAMPONARE LE CUTE PERISTOMALE CON MERCURO CROMO O EOSINA
- CONTROLLARE LA PERVIETA' DEI TUTORI URETERALI E LA CORRETTA POSIZIONE
- SE NECESSARIO CONTROLLARE LA PERVIETA' DEI CATETERI URETERALI, PRIMA ASPIRANDO LENTAMENTE CON LA SIRINGA, POI INTRODUCENDO NEL CATETERE URETERALE DUE CC DI FISIOLGICA STERILE E ASPIRARE NUOVAMENTE
- RIMUOVERE IL TAMPONE DI GARZA O PANNOCARTA
- ASCIUGARE LA CUTE PERISTOMALE
- APPLICARE LA PASTA BARRIERA O LA POLVERE SULLA GIUNZIONE MUCO-CUTANEA

CON SACCA DUE PEZZI

- RIMUOVERE LA PELLICOLA CHE PROTEGGE LA PLACCA
- INTRODURRE I TUTORI ALL'INTERNO DEL FORO DELLA PLACCA
- FAR ADERIRE LA PLACCA ALLA CUTE CON MOVIMENTI CIRCOLARI
- INTRODURRE I TUTORI NELLA SACCA DI RACCOLTA
- AGGANCIARE LA SACCA DI RACCOLTA ALLA PLACCA
- CONTROLLARE LA CHIUSURA DEL RUBINETTO DI SCARICO DELLA SACCA
- COMPLETARE L'ADESIONE CON MOVIMENTI DAL BASSO VERSO L'ALTO

CON SACCA MONOPEZZO

- RIMUOVERE LA PELLICOLA CHE PROTEGGE L'ADESIVO
- INTRODURRE I TUTORI ALL'INTERNO DELLA SACCA
- PIEGARE A META' LA SUPERFICIE ADESIVA DELLA SACCA
- APPOGGIARE IL MARGINE INFERIORE DEL FORO AL MARGINE INFERIORE DELLA STOMIA
- CHIUDERE IL RUBINETTO DI SCARICO DELLA SACCA
- ELIMINARE I RIFIUTI
- RIORDINARE IL MATERIALE

TEMPI :

PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA: 20 MINUTI

SOSTITUZIONE DEL PRESIDIO

SACCA DUE PEZZI:

SACCA DI RACCOLTA OGNI 24 ORE

PLACCA DI ADESIONE OGNI 48 ORE (SALVO ALTRE INDICAZIONI TERAPEUTICHE)

SACCA MONOPEZZO:
OGNI 24 ORE (SALVO ALTRE INDICAZIONI TERAPEUTICHE)

RIZZO GIOVANNA
OSPEDALE FELETTINO
AMBULATORIO DI UROLOGIA
0187 /533635